



DAGUSIBU

Dapatkan:

Obat dapat diperoleh dari apotek, rumah sakit, puskesmas dengan membawa resep dokter.

Gunakan:

Penggunaan obat harus sesuai dengan resep dokter.

Simpan:

Simpan obat pada suhu ruang (25°C), hindari dari sinar matahari, hindari dari jangkauan anak - anak.

Buang :

Jika obat sudah kadaluarsa dengan cara menggerus tablet sampai hancur kemudian jika perlu bias dikubur atau dibuang langsung.



Apa yang harus diketahui tentang obat antiplatelet?

Antiplatelet adalah obat-obatan yang menghambat pembentukan plak atau sumbatan dalam darah



Promosi Kesehatan Rumah Sakit

1.18LFT-PKRS/2019



ACETOSAL


1. Digunakan untuk:

Mencegah aterotrombosis penyakit infark miokard, sindrom Koroner (NSTEMI, STEMI, Angina Pectoris tidak stabil)

2. **Aturan Pakai:** 1 kali sehari pagi hari setelah makan

3. Efek Samping yang Mungkin Terjadi:

Mengalami mual, muntah, terjadi pendarahan, terjadi sesak nafas



4. Interaksi Obat:

- Dapat meningkatkan efek warfarin, heparin, digoxin, sulfonilurea
- Dapat menurunkan efek furosemid, spironolactone

5. **Penyimpanan:** Disimpan di suhu ruangan 15-25°C, terhindar dari cahaya matahari

*jika curiga terjadi efek samping dan efek interaksi obat, silahkan menghubungi dokter



GOLONGAN ANTI PLATELET

CLOPIDOGREL


1. Digunakan untuk:

Mencegah aterotrombosis penyakit infark miokard, sindrom Koroner (NSTEMI, STEMI, Angina Pectoris tidak stabil)

2. **Aturan Pakai:** 1 kali sehari pagi hari setelah makan

3. Efek Samping yang Mungkin Terjadi:

Mengalami mual, muntah, terjadi pendarahan, terjadi sesak nafas



4. Interaksi Obat:

- Dapat menurunkan efek clopidogrel jika diminum bersama omeprazole
- Dapat meningkatkan resiko pendarahan jika dikombinasikan dengan ticagrelor

5. **Penyimpanan:** Disimpan di suhu ruangan 15-25°C, terhindar dari cahaya matahari

*jika curiga terjadi efek samping dan efek interaksi obat, silahkan menghubungi dokter



TICAGRELOR

1. Digunakan untuk:

Mencegah aterotrombosis penyakit infark miokard, sindrom Koroner (NSTEMI, STEMI, Angina Pectoris tidak stabil)

2. **Aturan Pakai:** 2 kali sehari setelah makan

3. Efek Samping yang Mungkin Terjadi:

Mengalami mual, muntah, terjadi pendarahan, terjadi sesak nafas



4. Interaksi Obat:

- Dapat meningkatkan resiko pendarahan jika dikombinasikan dengan clopidogrel
- Dapat meningkatkan efek simvastatin, digoxin

5. **Penyimpanan:** Disimpan di suhu ruangan 15-25°C, terhindar dari cahaya matahari

*jika curiga terjadi efek samping dan efek interaksi obat, silahkan menghubungi dokter

