



# DAGUSIBU



## Dapatkan

Dapatkan di apotek ,  
Puskesmas, Rumah sakit,  
Toko obat berizin



## Gunakan

Gunakan sesuai resep dokter,  
jangan digunakan berlebihan  
tanpa petunjuk dokter karena  
akan terjadi pendarahan



## Simpan

Simpan pada suhu dibawah 30°C  
C, terlindung dari cahaya dan  
jangkauan anak-anak



## Buang

Buang jika obat sudah  
kadaluarsa dengan cara  
menggerus tablet sampai  
hancur kemudian dikubur atau  
dibuang pada tempat sampah.

## RSUP SANGLAH DENPASAR

# TERAPI DENGAN ANTIKOAGULAN WARFARIN

## Antikoagulan ??

Antikoagulan adalah obat yang bekerja  
untuk mencegah penggumpalan darah.  
Salah satu contoh obat antikoagulan  
adalah Warfarin



## WARFARIN ?

Warfarin digunakan untuk mengobati atau mencegah pembekuan darah di pembuluh darah atau arteri, yang dapat mengurangi risiko stroke, serangan jantung, atau kondisi serius lainnya.

Jika Anda menerima warfarin di rumah sakit, hubungi atau kunjungi dokter anda 3 hingga 7 hari setelah anda meninggalkan rumah sakit. Uji laboratorium INR (International Normalised Ratio) akan dilakukan pada saat itu.

Hubungi dokter anda jika anda menderita diare, demam, kedinginan, atau gejala flu, atau jika berat badan anda berubah.

Anda mungkin perlu berhenti minum warfarin 5 hingga 7 hari sebelum menjalani operasi, perawatan gigi, atau prosedur medis apa pun. Hubungi dokter anda untuk mendapatkan petunjuk.

Kenakan tanda peringatan medis atau bawa kartu ID yang menyatakan bahwa anda menggunakan warfarin. Setiap penyedia perawatan medis yang merawat Anda harus tahu bahwa anda minum obat ini.



## BAGAIMANA CARA PENGGUNAANNYA ?

### ATURAN PAKAI

**ATURAN PAKAI :** Minumlah warfarin sesuai dengan petunjuk dokter dan pada waktu yang sama setiap hari sebelum makan atau sesudah makan, jangan pernah minum obat dengan dosis ganda karena dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan

Jika anda mengalami efek samping seperti ruam kulit, mual, muntah, pendarahan yang tidak berhenti harap segera hubungi dokter

## EFEK SAMPING

RUAM KULIT



MUAL & MUNTAH



PENDARAHAN



## Interaksi dengan obat lain :

- Penggunaan obat warfarin bersamaan dengan obat rifampicin dapat menurunkan efek dari warfarin, jika anda sekarang sedang menggunakan obat rifampicin maka anda dapat menghubungi dokter anda untuk konsultasikan kembali

- Penggunaan obat warfarin bersamaan dengan obat clopidogrel, isoniazid, furosemide dapat meningkatkan efek warfarin sehingga resiko efek samping semakin besar, jika anda sekarang sedang menggunakan obat tersebut maka anda dapat menghubungi dokter anda untuk konsultasikan kembali.

Interaksi dengan makanan :

Penggunaan obat warfarin sebaiknya menghindari makanan yang mengandung tinggi vitamin K karena dapat menurunkan efek dari warfarin



**Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar**  
Jalan Diponegoro, Dauh Puri Klod  
Denpasar Barat, Bali 80113  
info @sanglahhospitalbali.com  
www.sanglahhospitalbali.com  
+62 (361) 227911-15

